

## CRITERI VALUTAZIONE

La Commissione stabilisce i criteri per la valutazione della **prova scritta** che vengono di seguito riportati: la Commissione ha a disposizione 30 punti per la valutazione della prova scritta e pertanto decide di assegnare 1 punto se corretta, 0 punti se errata.

Il superamento della prova scritta è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30.

La Commissione stabilisce i criteri per la valutazione della **prova pratica** che vengono di seguito riportati: la Commissione ha a disposizione 20 punti per la valutazione della prova pratica e pertanto decide di assegnare 2 punti se corretta, 0 punti se errata alla domanda a risposta multipla e n. 6 punti massimo ad ognuna delle domande a risposta sintetica.

Il superamento della prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

La Commissione stabilisce i criteri per la valutazione della **prova orale** che vengono di seguito riportati:

- precisione del linguaggio e dei termini utilizzati,
- sintesi espositiva,
- conoscenza della materia.

Il superamento della prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

PROVA NON ESTRATTA **1 (B) Cosa si intende per responsabilità disciplinare:**

- A Responsabilità che deriva dalla commissione di un reato
- B Responsabilità che deriva da un atto illecito che arreca danno patrimoniale
- C Responsabilità che deriva dalla violazione di un regolamento di disciplina
- D Nessuna delle alternative indicate è corretta

**2 Da chi è disposto il Trattamento Sanitario Obbligatorio:**

- A E' disposto dal Questore in presenza di due certificazioni mediche
- B E' disposto dal Prefetto in presenza di due certificazioni mediche
- C E' disposto dal Direttore Generale in presenza di due certificazioni mediche
- D E' disposto con provvedimento del Sindaco in presenza di due certificazioni mediche

**3 Cosa si intende per accreditamento istituzionale?**

- A L'erogazione di prestazioni sanitarie per conto della Regione
- B La trasformazione di una struttura privata in pubblica
- C Le autorizzazioni ad erogare prestazioni per conto del SSN
- D Nessuna delle precedenti

**4 In quale testo normativo è contenuta la frase: "Nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario, se non per disposizioni di legge"?**

- A Nella Costituzione
- B Nel Codice Penale
- C Nel Codice Civile
- D Nel Codice Deontologico

**5 Cosa significa l'acronimo IRCCS?**

- A Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
- B Istituto di ricovero a carattere scientifico
- C Istituto di ricovero convenzionato a carattere scientifico
- D Istituto di riabilitazione convenzionato a carattere specialistico

**6 La Legge 833/1978 ha abolito definitivamente le mutue?**

- A Sì
- B In parte
- C No
- D Solo alcune

**7 Per i lavoratori, la formazione e l'informazione in tema di sicurezza e salute sono:**

- A un dovere in base alla mansione
- B un diritto ed un dovere
- C un dovere secondo l'attività svolta
- D una scelta facoltativa

**8 In caso di emorragia digestiva provocata da rottura di varici esofagee si inserisce:**

- A La sonda di Salem
- B Il sondino di Levin
- C La sonda di Sengstaken-Blakemore
- D La sonda di Cantor

**9 Per eritema si intende:**

- A Colore giallastro della pelle e delle sclere oculare
- B Tonalità blu grigiastra della cute
- C Colore rosso porpora della cute a seconda del tempo di insorgenza
- D Tonalità rossastra con incremento della temperatura cutanea

<b>10</b>	<b>La prevenzione secondaria consiste:</b>
A	Nel supporto terapeutico e psichico del paziente portatore di malattia cronica
B	Nella diagnosi precoce di una malattia
C	Nella rimozione dei fattori di rischio ambientali
D	Nel controllo e contenimento degli esiti più complessi di una patologia

<b>11</b>	<b>La distruzione o disattivazione di microorganismi patogeni (ad eccezione delle spore), fino a livelli di sicurezza su materiali/superfici precedentemente deterse si definisce:</b>
A	Disinfezione
B	Sanificazione
C	Asepsi
D	Sterilizzazione

<b>12</b>	<b>Che cosa è l'embolia:</b>
A	Una virosi
B	Un'ostruzione vascolare
C	Una terapia d'urto
D	Nessuna delle alternative indicate è corretta

<b>13</b>	<b>La clearance della creatinina deve essere effettuata su un campione:</b>
A	Di sangue, più uno di urine delle 24 ore
B	Solo urine delle 24 ore
C	Solo di sangue
D	Di urine e di sangue prelevato la mattina

<b>14</b>	<b>Quando si indossano i guanti le mani devono essere lavate:</b>
A	Solo prima di indossarli
B	Prima e dopo averli indossati
C	Solo quanto evidentemente contaminate
D	Solo se si è venuti a contatto con liquidi organici

<b>15</b>	<b>La pinza anatomica è una pinza generalmente impiegata per manipolare tessuti molli, di uso comune; per definizione si considera una pinza:</b>
A	Atraumatica
B	Traumatica
C	Da dissezione
D	Da emostasi

<b>16</b>	<b>L'igiene della colostomia deve essere effettuata:</b>
A	Solo con acqua dall'interno verso l'esterno
B	Con acqua e sapone dall'esterno verso l'interno
C	Con soluzione disinfettante non a base alcolica
D	Con acqua e sapone dall'interno verso l'esterno

<b>17</b>	<b>Quale tipo di presidio permette l'erogazione fino al 90% di ossigeno?</b>
A	Maschera semplice
B	Cannula (tubo nasale)
C	Maschera di Venturi
D	Maschera con serbatoio

<b>18</b>	<b>Per quali delle seguenti patologie viene usata la manovra di Giordano?</b>
A	Prostatica
B	Renale
C	Polmonare
D	Epatica

<b>19</b>	<b>Quale dei seguenti gas viene usato nell'anestesia generale inalatoria?</b>
A	Protossido di azoto
B	Monossido di azoto
C	Ossido di azoto
D	Anidride carbonica
<b>20</b>	<b>La valutazione definitiva dell'arresto cardiaco si fa attraverso:</b>
A	l'ECG
B	il riscontro di assenza del polso periferico
C	il riscontro della scomparsa della pressione sanguigna
D	il riscontro di assenza di respiro spontaneo
<b>21</b>	<b>Se a distanza di 24-48 ore da una frattura di femore compare confusione mentale, allucinazioni, vomito, bisogna pensare a:</b>
A	emorragia cerebrale
B	embolia cerebrale
C	focolaio epilettico
D	ictus cerebrale
<b>22</b>	<b>Indicare il farmaco ad effetto antipertensivo:</b>
A	furosemide
B	fluniosolide
C	lacosamide
D	tozemifene
<b>23</b>	<b>il registro di SCARICO delle sostanze stupefacenti e psicotrope per la descrizione delle operazioni effettuate deve essere firmato:</b>
A	dal coordinatore infermieristico di Unità Operativa
B	dal medico prescrittore
C	dal professionista che esegue la somministrazione
D	dal Direttore di farmacia
<b>24</b>	<b>In quali condizioni c'è il rischio di sviluppare una cancrena gassosa?</b>
A	gravi lesioni a carico dei muscoli
B	ferite complicate dalla presenza di corpi estranei
C	amputazione di arti ischemici
D	Tutte le precedenti
<b>25</b>	<b>Nell'ulcera gastrica si può osservare:</b>
A	melena
B	ematuria
C	diarrea
D	Nessuna delle precedenti
<b>26</b>	<b>Il carcinoma a cellule squamose del polmone è più frequente in pazienti:</b>
A	ipertesi
B	diabetici
C	fumatori
D	ipotesi
<b>27</b>	<b>Per ascite si intende:</b>
A	Una raccolta liquida in cavo peritoneale
B	Una raccolta saccata, infetta, in cavo peritoneale
C	la presenza di versamento liquido in cavità pleurica
D	un processo infiammatorio a carico del cavo ascellare

<b>28</b>	<b>Il Piano Sanitario Nazionale ha durata:</b>
A	Triennale
B	Quadriennale
C	Biennale
D	Quinquennale

<b>29</b>	<b>Il modello concettuale di salute che rende più evidente la specificità della professione infermieristica è:</b>
A	il modello bio-organicistico
B	il modello psico-sociale
C	il modello bio-psico-sociale
D	il modello biologico

<b>30</b>	<b>Quale è il farmaco di pronto impiego di fronte a crisi ipertensiva in ambiente extra-ospedaliero?</b>
A	Nifedipina via sublinguale
B	Captopril per os
C	Nitroglicerina via sublinguale
D	Verapamil ev



<b>1</b>	<b>L'art. 1 della Legge 10 agosto 2000, n. 251 chiarisce che gli operatori delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche svolgono assistenza:</b>
A	Con autonomia professionale e utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi
B	Con autonomia professionale limitata ed espletando le funzioni previste dagli specifici codici deontologici
C	Con autonomia professionale limitata ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi
D	Con autonomia professionale mettendo in atto una metodologia assistenziale per compiti

<b>2</b>	<b>Indicare quale tra le seguenti è una fonte autorevole di revisione sistemica della letteratura biomedica:</b>
A	C.I.N.A.H.L.
B	Google
C	Cochrane Library
D	Elsevier

<b>3</b>	<b>Cosa si intende per sorveglianza sanitaria?</b>
A	Periodicità dei controlli medici dei lavoratori
B	Insieme di atti medici, finalizzati alla salute e sicurezza dei lavoratori
C	Insieme di visite specialistiche offerte ai lavoratori
D	Ciclicità dei controlli medici e non offerti ai lavoratori

<b>4</b>	<b>Secondo l'articolo 32 della Costituzione, i trattamenti sanitari:</b>
A	Sono scelti dal medico
B	Sono scelti dall'interessato
C	Sono scelti liberamente dall'interessato, salvo i casi previsti dalla legge
D	Sono scelti dall'interessato su consiglio medico

<b>5</b>	<b>Da quale delle seguenti norme è disciplinata l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG)?</b>
A	Dalla L.194/1978
B	Dalla L.502/1992
C	Dalla L.833/1978
D	Nessuna delle precedenti

<b>6</b>	<b>Chi individua i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza)?</b>
A	Le ASL
B	Lo Stato
C	Le Regioni
D	Le Province

<b>7</b>	<b>Per rendere possibile un'evacuazione durante un'emergenza, è bene controllare giornalmente:</b>
A	La percorribilità delle vie di fuga
B	Lo stato dei dispositivi individuali
C	La visibilità degli estintori
D	La carica degli estintori

<b>8</b>	<b>La complessità assistenziale è utile ai fini:</b>
A	Dell'identificazione delle necessità di assistenza indiretta della persona assistita
B	Dell'identificazione del fabbisogno di risorse umane e materiali necessarie per rispondere alle necessità assistenziali della persona assistita
C	Dell'identificazione delle necessità assistenziali della persona assistita
D	Dell'identificazione delle necessità di informazione/formazione del caregiver nella gestione della persona assistita

<b>9</b>	<b>Se durante una trasfusione di globuli rossi il paziente manifesta brividi, cefalea, dolori, sensazione di calore, è necessario immediatamente:</b>
A	Diminuire la velocità di infusione e chiamare il medico
B	Sospendere la trasfusione, tenerla la vena aperta con soluzione fisiologica e chiamare il medico
C	Diminuire la velocità di infusione e avisare il servizio di emoteca
D	Controllare i parametri vitali e chiamare il medico

<b>10</b>	<b>La definizione di emottisi:</b>
A	Emissione di sangue dalle vie respiratorie attraverso la tosse
B	Emissione di sangue dal cavo orale
C	Emissione di sangue con le feci
D	Emissione di sangue con il vomito

<b>11</b>	<b>L'attacco ischemico transitorio (TIA):</b>
A	E' un episodio di deficit neurologico di durata superiore a 24 ore
B	Non presenta alterazioni della coscienza
C	E' un episodio di deficit neurologico di durata inferiore a 24 ore
D	Ha come causa principale una emorragia subaracnoidea

<b>12</b>	<b>La scala di Braden valuta:</b>
A	Il rischio di insorgenza di lesioni da pressione
B	Il rischio di caduta
C	La disabilità successiva a ictus
D	Il grado di autonomia nelle attività di vita quotidiana

<b>13</b>	<b>La persona con deficit nella deambulazione è a rischio di:</b>
A	Vertigini
B	Deficit sensoriale
C	Ictus
D	Cadute accidentali

<b>14</b>	<b>Nell'occlusione intestinale l'alvo è:</b>
A	Intermittente
B	Chiuso a feci e gas
C	Aperto a gas
D	Irregolare

<b>15</b>	<b>Il trattamento chirurgico della tiroide implica il rischio di complicanze. Indicare quella specifica:</b>
A	Infezione sistemica
B	Lesione ricorrente
C	Lesione vascolare
D	Nessuna delle alternative indicate è corretta

<b>16</b>	<b>Da cosa è caratterizzato lo shock cardiogeno?</b>
A	Aumentata gittata cardiaca
B	Rottura di varici esofagee
C	Crisi ipertensiva
D	Diminuzione della gittata cardiaca

<b>17</b>	<b>Il Respiro di Cheyne-Stokes è caratterizzato da:</b>
A	Fase espiratoria protratta, inefficace e con respiro superficiale più frequente
B	Frequenza respiratoria superiore a 20 atti al minuto e respiro profondo regolare
C	Respiro caratterizzato da un ciclo respiratorio che aumenta gradualmente e poi si riduce in frequenza e profondità, a cui segue un periodo di apnea
D	Periodi di apnea alternati irregolarmente ad una serie di respiri superficiali di uguale profondità

<b>18</b>	<b>Normalmente l'infusione di mannitolo provoca:</b>
A	Aumento dei valori pressori
B	Aumento della diuresi
C	Diminuizione del riflesso della tosse
D	Diminuizione della frequenza cardiaca

  

<b>19</b>	<b>In quale di queste condizioni la potassiemia risulta diminuita?</b>
A	Insufficienza renale acuta
B	Insufficienza surrenale cronica
C	Crisi emolitica acuta
D	Diarrea cronica

  

<b>20</b>	<b>Quale di queste sostanze oppioidi NON crea un alto rischio di dipendenza?</b>
A	Eroina
B	Metadone
C	Morfina
D	Codeina

  

<b>21</b>	<b>Nel quadro dello shock settico NON è presente:</b>
A	Ipotensione
B	Bradycardia
C	Brivido che precede l'ipotensione
D	Cute calda e asciutta

  

<b>22</b>	<b>Un paziente di 60 anni presenta da tempo tosse stizzosa e febbre irregolare. Il primo esame da richiedere ai fini della diagnosi è:</b>
A	RX Torace
B	Esame citologico dell'espettorato
C	Tine-test
D	Broncoscopia

  

<b>23</b>	<b>L'ultima versione del Codice Deontologico degli Infermieri è del:</b>
A	2016
B	2019
C	2010
D	2015

  

<b>24</b>	<b>Dove è situato il nodo del seno atriale?</b>
A	Fascio di His
B	Atrio sinistro
C	Atrio destro
D	Ventricolo destro

  

<b>25</b>	<b>L'oliguria è la:</b>
A	Presenza di sangue nelle urine
B	Mancata produzione di urina
C	Produzione di urina <500 ml/24 ore
D	Mancata emissione all'esterno di urina presente in vescica

  

<b>26</b>	<b>Il curaro blocca:</b>
A	I ricettori adrenergici
B	I recettori muscarinici
C	I recettori dopaminici
D	La placca motrice





<b>27</b>	<b>Il detergente è una sostanza chimica che:</b>
A	Inibisce la formazione di carica batterica
B	Diminuisce la tensione superficiale favorendo l'asportazione dello sporco
C	Impedisce la moltiplicazione dei germi patogeni
D	Favorisce la disinfezione senza ridurre la carica batterica

<b>28</b>	<b>Quale delle seguenti sostanze causa più frequentemente ulcera gastrica?</b>
A	Farmaci antinfiammatori non steroidei
B	Liquirizia
C	Antibiotici
D	Bicarbonato di sodio

<b>29</b>	<b>La sigla AIFA è l'acronimo di:</b>
A	Associazione Italiana Farmacisti
B	Agenzia Italiana del Farmaco
C	Associazione Italiana Farmacie
D	Associazione Italiana del Farmaco Alternativo

<b>30</b>	<b>Una rarissima sede per una gravidanza ectopica:</b>
A	Addominale
B	Angolare
C	Ampollare
D	Non esiste una sede rara per le gravidanze ectopiche



<b>1</b>	<b>Il Decreto Ministeriale 14/09/1994 n. 739:</b>
A	Istituisce il regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere
B	Istituisce il Servizio Sanitario Nazionale
C	Definisce il Codice Deontologico dell'infermiere
D	Sostituisce la denominazione "Professione Sanitaria Ausiliaria" in "Professione Sanitaria"

<b>2</b>	<b>Il fascicolo sanitario elettronico(FSE):</b>
A	Copre l'intera vita del paziente
B	Dura un anno
C	Dura dieci anni
D	Dura cinque anni

<b>3</b>	<b>Il decreto legislativo 81/2008 si applica:</b>
A	A tutti i settori lavorativi
B	Solo ai settori privati
C	Solo ai settori pubblici con tipologia di lavoro a rischio
D	Solo ai settori privati con tipologie di lavoro a rischio

<b>4</b>	<b>Cosa sono i SERT?</b>
A	Servizi per le tossicodipendenze
B	Servizi immunotrasfusionali
C	Servizi di vigilanza sanitaria
D	Nessuna delle precedenti

<b>5</b>	<b>Con quale delle seguenti norme è stato istituito il Sistema Sanitario Nazionale?</b>
A	Dal D.Lgs 502/1992
B	Dall'articolo 32 della Costituzione
C	Dalla L. 833/1978
D	Dalla L. 833/1972

<b>6</b>	<b>Quale è la funzione primaria del Ministero della Salute?</b>
A	La scelta degli interventi e dei farmaci
B	La tutela e la salvaguardia della salute pubblica
C	Il coordinamento delle Regioni, Comuni e Province in materia sanitaria
D	Il coordinamento delle Aziende Sanitarie

<b>7</b>	<b>Il modello assistenziale caratterizzato da un'organizzazione del lavoro in serie, per linea di attività, prende il nome di:</b>
A	Modello tecnico o per compiti
B	Modello primary care
C	Modello personalizzato di cure
D	Modello per piccole équipe

<b>8</b>	<b>Evidence Based Nursing significa:</b>
A	Utilizzare nella pratica clinica i modelli concettuali
B	Utilizzare nella pratica le migliori prove di efficacia in associazione con il giudizio clinico
C	Evidenziare le problematiche assistenziali
D	Utilizzare nella pratica le tecniche che gli operatori preferiscono

<b>9</b>	<b>Per la preparazione ad un intervento chirurgico per causa emorragica in regime di urgenza, tra i seguenti interventi è prioritario:</b>
A	Posizionare un catetere vescicale
B	Avvisare i parenti
C	Incannulare una vena
D	Somministrare antibiotici

<b>10</b>	<b>Quale delle seguenti è la più precoce alterazione rilevabile in corso di infarto miocardico acuto?</b>
A	Aumento della glicemia
B	Sopraslivellamento ST
C	Aumento del CPK
D	Aumento di LDH

<b>11</b>	<b>Un pap-test falso negativo può essere dovuto a:</b>
A	Prelievo adeguato
B	Fattori causa effetto
C	Operatore non esperto
D	Microclima inadeguato

<b>12</b>	<b>Qual è il ruolo dell'infermiere durante effettuazione di puntura lombare?</b>
A	Mantenere la testa del paziente anteroflessa
B	Mantenere le ginocchia del paziente vicino al torace
C	Far assumere al paziente un decubito laterale
D	Tutte le precedenti

<b>13</b>	<b>In quale distretto va eseguita la paracentesi?</b>
A	Epigastrio
B	Fossa iliaca sinistra
C	Fossa iliaca destra
D	Ipogastrio

<b>14</b>	<b>L'insulina sottocutanea va evitata in caso di.</b>
A	Ciclo mestruale
B	Aree cutanee ustionate
C	Aree cutanee ricche di adipe
D	Sepsi

<b>15</b>	<b>La misurazione della PVC va eseguita ponendo il paziente:</b>
A	In posizione supina
B	In posizione laterale sinistra
C	Seduto con capo allineato al torace
D	Posizione di Fowler

<b>16</b>	<b>Nelle malattie diarroiche è molto importante evitare l'assunzione di:</b>
A	Liquidi
B	Nutrienti ad elevata osmolarità
C	Proteine
D	Amidi



<b>17</b>	<b>Nell'anziano il rischio di cadute è dovuto essenzialmente a:</b>
A	Alterazioni vestibolari
B	Alterazioni visive
C	Alterazioni della propriocezione
D	Tutte le risposte sono corrette

<b>18</b>	<b>Prelievo per emogasanalisi. Occorre preparare una siringa sterile da:</b>
A	5,5 ml non eparinata
B	insulina eparinata
C	2 ml eparinata
D	tutte le risposte sono errate

<b>19</b>	<b>Il consenso informato è richiesto</b>
A	Negli interventi chirurgici
B	Negli esami endoscopici
C	In caso di anestesia generale
D	Tutte le risposte sono corrette

<b>20</b>	<b>Di solito al momento del parto la presentazione del feto è:</b>
A	Di faccia
B	Podalica
C	Di vertice
D	Supina

<b>21</b>	<b>Indicare il farmaco ad azione antivirale:</b>
A	Nimesuline
B	Acyclovir
C	Metotrexane
D	Chinolonici

<b>22</b>	<b>La ERCP viene eseguita per studiare:</b>
A	I dotti pancreatici e biliari
B	Le arterie coronarie
C	Il tratto sigma-retto
D	L'albero bronchiale

<b>23</b>	<b>Il delirium tremens può intercorrere nel corso della sindrome di astinenza da:</b>
A	Etanolo
B	Cocaina
C	Morfina
D	Anfetamine

<b>24</b>	<b>Attualmente le misure di isolamento in ospedale prevedono l'utilizzo di precauzioni:</b>
A	Universali
B	Standard e aggiuntive
C	Per i liquidi biologici in persone con HCV positivo
D	Per i liquidi biologici

<b>25</b>	<b>Nel caso di persona con insufficienza respiratoria acuta, quale dei seguenti segni/sintomi NON vi aspettereste di osservare?</b>
A	Attivazione dei muscoli respiratori accessori
B	Tachipnea
C	Bradycardia
D	Dispnea

<b>26</b>	<b>Una frattura dell'XI costola sinistra può determinare:</b>
A	Una contusione del pancreas
B	Una rottura del fegato
C	Una rottura della milza
D	Una rottura dell'angolo colico sinistro

<b>27</b>	<b>La corretta esecuzione dell'esame per emocoltura prevede:</b>
A	Un prelievo subito dopo la somministrazione dell'antibiotico
B	Più prelievi in concomitanza con l'acme febbrile
C	Il prelievo a digiuno
D	Due prelievi a distanza di 12 ore

<b>28</b>	<b>I principali rischi presenti in ospedale sono:</b>
A	Biologico, chimico, fisico, infortunistico e stress
B	Meccanico, fisico e infortunistico
C	Non sono presenti rischi perchè è un ospedale
D	Meccanico, fisico e stress

<b>29</b>	<b>I segni fondamentali della peritonite acuta generalizzata sono:</b>
A	Febbre e leucocitosi
B	Contrattura addominale
C	Shock
D	Tutte le precedenti

<b>30</b>	<b>Il Mini Mental State Examination (MMSE) valuta:</b>
A	Lo stato funzionale
B	Il rischio di caduta
C	Il deficit cognitivo
D	Il rischio di malnutrizione

Prova estratta Grae Baugini

**PROVA PRATICA N. 1**



ATTRIBUIRE IL CORRETTO ORDINE CRONOLOGICO ALLE SEGUENTI OPERAZIONI CONCERNENTI LA PROCEDURA DI SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI PER VIA OCULARE:

6. verificare se il paziente è allergico alla sostanza da somministrare
2. chiedere al paziente se preferisce auto-instillarsi il farmaco e se ne è capace
1. preparare il materiale occorrente
5. invitare il paziente a mettersi in posizione supina con il capo leggermente iperesteso
7. mettere una garza sotto la palpebra inferiore
4. aprire il flaconcino
3. lavare le mani e indossare i guanti

- a) 6-1-2-3-5-4-7
- b) 3-5-7-6-4-2-1
- c) 2-1-3-6-7-4-5
- d) 4-3-7-6-1-5-2

ATTRIBUIRE IL CORRETTO ORDINE CRONOLOGICO ALLE SEGUENTI OPERAZIONI CONCERNENTI LA PROCEDURA DI PREPARAZIONE DI UN CAMPO STERILE:

7. disinfettare il piano di lavoro
2. porre il pacco dei teli sterili al centro della superficie di lavoro, a livello o sopra la vita. L'area di lavoro si deve trovare all'interno del campo visivo dell'operatore
6. indossare i guanti sterili o servirsi di una pinza sterile per utilizzare il materiale all'interno del campo sterile
4. lavorando lateralmente, aprire il lato esterno dell'involucro e rimuovere il telo esterno afferrandolo dagli angoli. Tenerlo lontano dal corpo sopra la vita e da ogni altra superficie
1. posizionare il telo sul piano di lavoro con la parte idrorepellente rivolta verso il basso
3. eseguire lavaggio antisettico delle mani o frizionamento alcolico
5. controllare l'integrità delle confezioni sterili e la loro scadenza

- a) 6-2-4-1-5-7-3
- b) 5-3-7-6-2-4-1
- c) 3-5-7-2-4-1-6
- d) 7-3-2-1-6-5-4

ATTRIBUIRE IL CORRETTO ORDINE CRONOLOGICO ALLE SEGUENTI OPERAZIONI CONCERNENTI LA PROCEDURA DI ESECUZIONE PULSOSSIMETRIA:

6. applicare il sensore
7. connettere il sensore all'ossimetro (laddove non sia già collegato)
5. lavarsi le mani
2. annotare i risultati della procedura
4. rimuovere lo smalto, se presente
1. individuare il sito più appropriato per applicare il sensore
3. riferire al clinico ogni risultato anormale

- a) 5-6-7-4-3-2-1
- b) 1-3-5-7-6-2-4
- c) 5-1-4-6-7-2-3
- d) 2-3-7-1-6-4-5



Prova non estratta Irene Bucci

PROVA N. 2



ATTRIBUIRE IL CORRETTO ORDINE CRONOLOGICO ALLE SEGUENTI OPERAZIONI CONCERNENTI LE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE CALZE ELASTICHE:

6. capovolgere la calza sul piede del paziente
  3. ripetere l'operazione per l'altra gamba
  1. applicare le calze mantenendo il paziente in posizione supina
  7. misurare la gamba del paziente per identificare la taglia idonea, con paziente supino
  2. usando due mani, trascinare la gamba fino al tallone
  5. utilizzando la stessa tecnica, portare la calza verso l'alto fino a completa vestizione
  4. posizionare la mano all'interno della calza con la parte interna rivolta verso l'esterno e con la stessa afferrare l'alluce
- a) 7-1-4-6-2-5-3
  - b) 3-5-4-2-1-6-7
  - c) 7-1-3-4-5-6-2
  - d) 2-3-1-7-4-6-5

ATTRIBUIRE IL CORRETTO ORDINE CRONOLOGICO ALLE SEGUENTI OPERAZIONI CONCERNENTI LE PROCEDURE DI FARMACI TOPICI:

6. in caso di ferita aperta, pulire l'area con acqua calda
  7. cambiare i guanti
  4. lavarsi le mani
  3. indossare i guanti
  1. confermare l'assenza di allergie al farmaco da somministrare
  5. verificare le condizioni della cute del paziente
  2. invitare il paziente ad assumere la posizione idonea alla somministrazione
- a) 2-7-1-6-3-5-4
  - b) 6-1-5-2-4-3-7
  - c) 4-1-2-3-6-5-7
  - d) 3-7-5-4-2-1-6

ATTRIBUIRE IL CORRETTO ORDINE CRONOLOGICO ALLE SEGUENTI OPERAZIONI CONCERNENTI LE PROCEDURE DELL'URINOCOLTURA IN PAZIENTE AUTONOMO:

8. istruire il paziente ad eseguire un'igiene perineale accurata con acqua e detergente
  3. tenere a portata di mano il contenitore sterile e iniziare a far urinare il paziente, lasciando fluire le prime urine per circa 25 ml nella toilette e/o padella
  1. chiudere il contenitore e far terminare la minzione
  6. porre il contenitore sotto flusso urinario e raccogliere il mitto intermedio, senza appoggiare il contenitore sui genitali esterni
  7. accompagnare ed assistere il paziente al bagno
  5. aprire il contenitore facendo attenzione a non toccare la parte interna del tappo e del contenitore stesso
  4. spiegare la procedura al paziente
  2. assistere il paziente al bagno
- a) 2-5-1-8-7-4-3-6
  - b) 4-8-7-5-3-6-1-2
  - c) 8-6-3-2-5-1-7-4
  - d) 4-1-8-5-7-6-3-2







*Prova non estratta prova Base* **PROVA N. 3**

ATTRIBUIRE IL CORRETTO ORDINE CRONOLOGICO ALLE SEGUENTI OPERAZIONI CONCERNENTI LA PROCEDURA DI RILEVAZIONE DEL POLSO (FREQUENZA CARDIACA).

1. Posizionare indice e medio sull'arteria radiale e applicare una leggera pressione fino ad apprezzare il battito
5. Flettere il gomito del paziente in modo da portare la parte posteriore del braccio lungo il petto
6. Sostenere il polso
3. Identificare il ritmo
7. Informare il paziente sulla procedura che si svolgerà
2. Lavarsi le mani
4. Determinare il volume

- a) 4-6-7-5-3-2-1
- b) 2-7-5-6-1-3-4
- c) 1-5-4-3-2-6-7
- d) 3-2-4-7-1-6-5

ATTRIBUIRE IL CORRETTO ORDINE CRONOLOGICO ALLE SEGUENTI OPERAZIONI CONCERNENTI LA PROCEDURA DI CATETERIZZAZIONE URINARIA (FEMMINILE E MASCHILE)

3. Assicurare una fonte di luce idonea
6. Aprire il kit per cateterizzazione in maniera sterile
7. Lavare le mani e indossare i guanti monouso
2. Preparare l'occorrente per la procedura
1. Mettere il paziente in posizione supina con gambe larghe e piedi paralleli
5. Sfilare via i guanti e lavare le mani
4. Disinfettare la zona perineale

- a) 2-1-3-7-4-5-6
- b) 2-1-3-5-6-7-4
- c) 2-5-6-7-4-3-1
- d) 7-1-6-2-3-4-5

ATTRIBUIRE IL CORRETTO ORDINE CRONOLOGICO ALLE SEGUENTI OPERAZIONI CONCERNENTI LA PROCEDURA DI SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI PER VIA RETTALE:

6. preparare il farmaco (supposta) e lubrificare il dito deputato all'inserimento
4. preparare il materiale occorrente
5. indossare i guanti
1. garantire la privacy
7. invitare il paziente ad assumere la posizione di decubito laterale sinistro con gamba destra piegata verso il petto
2. informare il paziente sulla sensazione di pressione che avverterà
3. lavarsi le mani

- a) 5-3-2-1-4-7-6
- b) 1-3-5-7-6-4-2
- c) 3-1-7-5-6-4-2
- d) 4-1-3-5-7-6-2

**ATTRIBUIRE IL CORRETTO ORDINE CRONOLOGICO ALLE SEGUENTI OPERAZIONI CONCERNENTI LA PROCEDURA DI ESECUZIONE DI UNA TRASFUSIONE DI SANGUE:**

- 3. inserire il secondo rubinetto nella sacca di sangue e tenere il rubinetto chiuso
- 7. lavare le mani
- 1. innestare il set da trasfusione nel contenitore di soluzione fisiologica e riempire il deflussore
- 2. misurare i parametri vitali del paziente
- 6. verificare l'identità del paziente con i dati riportati sulla sacca (nome, cognome, numero identificativo della sacca, gruppo sanguigno, fattore RH) e annotare il riconoscimento della stessa in cartella
- 5. assicurare il rubinetto al catetere venoso
- 4. preparare il materiale

- a) 4-5-6-7-1-2-3
- b) 1-4-2-5-7-6-3
- c) 5-4-6-7-1-2-3
- d) 4-2-6-7-1-3-5

**Procedura per corretta medicazione ferita chirurgica pulita:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Materiali e procedura per aspirazione del paziente tracheostomizzato:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---